

Observation

Sur une opération de Cataracte suivie de l'issue de l'iris
avec des Remarques générales sur cette opération.

Par M. Terras, m. en chit. à Genève

un ministre de l'évangile, pasteur de l'église du village d'Ecublens.
pres de Lausanne âgé d'environ 55 à 60. ans d'une bonne
constitution arriva à Genève le premier jour du mois de 7. 7. 80.
avec une cataracte à chaque oeil. Sur les avis qu'avait eu ces pasteurs
du succès de quelques opérations de cataracte que j'avais faites. Il s'adressa
à moi l'examen fait de l'état de son oeil, je reconnus deux cataractes
parfaitement à l'oeil, & dans le cas de l'opération, après les préparations
que je ne portais pas aussi loin que je l'aurais souhaité, le malade ne
se décida que pour l'opération d'un de ses yeux que je fis le 7. 7. 80
à dix heures du matin en présence de M. Manger Docteur médecin de
cette ville et M. Gujon m. en chirurgie de l'Académie royale de chirurgie
de Paris. Et de quelques élèves en chirurgie. Bien que j'eusse à mon
disposition les instruments de M. Lafaye. Chirurgien grand jeune & je me
servis d'un instrument particulier ainsi que je l'ai dit & après tout se
passa heureusement. Le cristallin sorti en entier sans que j'aie été
obligé d'inciser la membrane cristalline, je ne fis distinguer aucun
objet au malade. Je couvris le deuxième d'un appareil très simple
que je fis arroser toute la nuit avec une légère infusion de fleurs de
surcou. et dans la suite je ne me servis que de l'eau pure mêlée avec
un quart d'eau rose. mon malade passa la nuit fort tranquillement
je passai sur toute la période précaution qu'il conviendrait de prendre après
l'opération. soit par rapport à la situation, et au régime et même des
générations. Ces préceptes sont déjà le plus établis de nos auteurs. Et bien
qu'il y ait encore beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce sujet
qu'il ne conviendrait pas de penser de placer dans une simple observation
qui est relative à des circonstances particulières.

Le troisième jour de l'opération le malade se plaignait d'un
il comme d'un picotement dans l'oeil qui ne lui était cependant que
peu douloureux. Le lendemain quatrième jour de l'opération je voulus

Cote trente cinq pages

A. Durand

1^{re} feuille

ARC 24 d. 89



savoir l'état de l'œil. j'observai un peu d'œdème aux paupières - l'œil était larmoyant. la conjonctive enflammée. mais non pas d'une inflammation violente. et par un examen plus attentif je remarquai un corps comme une portion de membrane qui se présentait par une ligne grise. hors de l'œil. de l'incision de la cornée. ce corps couvrait la partie inférieure du cercle du cercle ciliaire et remplissait l'œil - sur la petite place de la cornée. le mouvement de la paupière supérieure - causait quelque douleur au malade par le frottement qu'elle faisait sur la place de la cornée et sur le corps qui s'y présentait. le malade distinguait bien la lumière de ténèbres, mais pour le objet de grand jour l'affectant même assez vivement. pour ne pas davantage fatiguer l'œil du malade. je me contentais pour le jour de ces recherches. Bien loin l'idée que c'était l'iris qui se présentait à travers la place de la cornée,

je fus étonné de faire le lendemain par un second examen. les choses - dans la circonstance de l'iris j'en vis tout bas inférieur se porter par la place de la cornée même au delà de l'étendue indiquée. l'œil continuait à être larmoyant et le chagrin de la paupière supérieure de globe paraissait un peu assésé, ou du moins moins plein que l'autre. le malade avait par intervalles un peu de douleur de tête qui le rapportait au dessus du sourcil et vers le haut du front du côté opéré, il ne laissait cependant pas d'ailleurs que de jouir d'un peu de tranquillité et il restait levé une partie de la journée. c'était au moins la 8^e jour de l'opération.

M. le patient ne laissait pas que d'être assez ingrat sur cet événement j'en étais également fâché par ce qu'il retardait la guérison de l'opération et pouvait même s'y opposer. je n'ignorais cependant pas qu'il fut très possible qu'il put arriver un pareil événement et qu'il ne fût la cause d'un effort déjà arrivé à bien de praticiens après l'opération de la cataracte par la méthode d'extraction.

Certain de l'issue d'une partie de l'iris voyant d'ailleurs que tout restait dans le même état. savoir l'œdème de paupières. l'inflammation

l'inflammation variée de la conjonctive, et la troisième le 15^e jour de l'opération en présence de Mr Guyon je fis une tentative pour tâcher de faire rentrer l'iris dans sa place naturelle. pour cet effet le malade placé dans la même situation que pour l'opération, je fis tenir la paupière supérieure et l'inférieure tandis que j'avais soin du globe de la paupière inférieure avec ma main gauche. de la droite je pris une curette que je portai très doucement sur l'iris, & peine eû-je fait un léger mouvement pour le faire rentrer - que le malade recula sa tête brusquement, s'écriant qu'il venait de sentir une douleur des plus vives qui se communiquait jusqu'au sommet de sa tête. L'impression de cette douleur se fit sentir au malade pendant une demi-heure. le lendemain et le jour suivant il ne se ressentit plus de ces ébranlements de l'iris, le globe resta dans le même état. Le malade impatient désirait de retourner dans sa famille. ce qui m'obligea huit jours après ce qui s'est passé de chercher encore quelques moyens pour remédier à l'issue de l'iris, la conséquence je le fis placer d'une manière convenable. j'essayais avec une petite pince de saisir la portion de l'iris qui excédait le niveau de la lèvre de l'incision de la cornée pour être me l'ai je décidai à la couper. mais au 1^{er} léger pincement ou plutôt attouchement avec la pince, il arriva au malade le même phénomène que j'ai vu avant. je l'arrêtai pour lors ces affaires aux soins de la nature. et je n'ai pas eu lieu de m'en repentir. Comme l'on verra ci après. ainsi que les raisons qui m'y déterminaient.

103.
semaine

Cependant la troisième de l'opération le mouvement des paupières devint plus libre moins douloureux. le troisième jour après l'opération ainsi que d'inflammation de la conjonctive et l'œdème des paupières. le globe était toujours un peu affaibli et flétri. c'est à dire qu'il n'avait pas la même rotondité qu'il avait. par conséquent un peu moins plein. par un examen fait de bien près je voyais s'apparaître une pellicule fine qui commençait vers l'angle de l'un et l'autre côté de l'incision de la cornée. la avançant même



jusqu'au milieu. En couvrant la portion d'iris qui se présentait, qui ne m'eût paru pas si avancée qu'il en paraissait. quoiqu'il y eût la levée de la division de la cornée était encore écartée, même l'épave sur tout dans leur partie moyenne.

Dans ces ligues de temps depuis l'opération c'est à dire la troisième semaine, un jour le malade m'apprit sur le soir qu'il devait par avec son oeil opérer d' distinguer les couleurs. Ce qui l'encouragea beaucoup pour la réussite et l'expérience de recouvrer sa vue malgré l'inconvénient qui lui était encore, à cette époque. Je lui fis de l'opération le malade restait tout le jour levé tantôt assis tantôt se promenant dans sa chambre. L'oeil n'était couvert que d'un simple linge grossier placé légèrement la manière d'abat jour.

Au commencement de la sixième semaine de l'opération le malade voulut absolument porter à tout égard son oeil était mieux. mais l'iris se présentait encore, le pût les moyens continuais aussi. Il distinguait les couleurs d'une manière plus marquée et plus sûre. Il était cependant bien éloigné de voir du degré de lumière désiré. Le soir sur le porteur portait même d'un abat-jour double d'un taffetas vert dans une voiture assez content. plein de l'expérience que je lui avais donnée qu'il recouvrerait sa vue au point de pouvoir faire les fonctions pastorales. j'avoue avec sincérité que je doutais beaucoup de la complaisance de mes promesses je lui prescrivis tout ce que je crus nécessaire pour le conduire à un point si intéressant.

Le malade fit son voyage heureusement trois semaines après son arrivée chez lui, il m'écrivit que son oeil l'était beaucoup mieux et que sa vue se fortifiait tous les jours. qu'il avait la plus grande et la plus flatteuse espérance. il m'écrivait de la façon suivante que j'en étais très touché. Je lui fis le porteur.

au commencement du mois de décembre. La fin de l'opération

(a)
quelque temps,

de l'opération. je lui écrivis une lettre par laquelle je lui demandais
plusieurs choses relatives aux circonstances de son oeil opéré. Son vœux la
réponse d'atténuer du 4^e jour du mois de Décembre.

22 L'oeil ne paraît plus pincé, de la si je comprends bien votre seconde
22 question, la cicatrice couvre la corne, par la même, la lèvre supérieure
22 est au niveau de l'inférieure. Elle moins haute paraît-il être de même
22 forme que l'autre, au lieu que dans le commencement j'étais mon-
22 velle il était flétri & beaucoup plus petit. La seule différence qu'on
22 remarque à présent entre les deux yeux est que l'oeil opéré n'a pas
22 comme l'autre la prunelle ronde, le mouvement de la prunelle est
22 aussi aisé que l'autre, & sans la moindre douleur. Ce qui semble
22 confirmer qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour la cicatrice en que le
22 pincement de l'oeil a disparu. Je puis vous assurer qu'il n'y a plus
22 de l'os moyeu.

22 Pour le spectacle continue ainsi, la lumière vive affecte toujours —
22 fait jusqu'à un certain point, telle est la lumière du Soleil, de
22 la chandelle, ou même un jour trop clair. mais je ne suis jamais
22 affecté d'un jour sombre, lors que je ne regarde par la fenêtre
22 et cette lumière vive me cause toujours un petit picotement. mais
22 sans douleur. je n'ai point eu de mal de tête. il n'y a même
22 plus de larmes n'y voyez à l'oeil. j'ai le sommeil tranquille. je
22 vois assez sans lunettes pour me conduire. je distingue même les objets
22 d'une certaine distance lors qu'ils sont grands. et les grands —
22 caractères. les verres me font paraître l'écrite plus noire et les —
22 caractères plus distincts, mais plus petits. C'est à leur faveur que
22 je commence à pouvoir lire mais bien tôt mon oeil en est fatigué
22 pour les verres que vous m'avez envoyés j'ai estimé de garder ceux
22 qui favorisent le plus ma vue. qui ont entre trois et quatre —
22 pouces de foyer. me le spectacle me fit écrire cette longue lettre
22 qu'il a signée lui-même. fait l'état où il me marque qu'il se
22 trouve le quatrième mois de son opération.



Le 10^e mois suivant 1771. Le 4^e mois de l'opération. M^r le posteur.
 M^r écrivit lui même d'une belle écriture très nette, les vers suivantes.
 " J'ai repris une partie de fonctions de mon ministère sans
 " en être incommodé. y e fais dans le dessein de le reprendre toute la
 " paye. je ne puis cependant avec l'œil simple faire aucune lecture
 " Les lettres magnifiques du plus grand format sont les seules à l'apporter
 " de mon oeil. mais au moyen de lunettes je lis toutes sortes de caractères,
 " une chose qui me surprend comme je vous l'ai marqué par mon
 " précédent le verre ou lunettes aggrément les caractères bien loin de
 " les grossir. aussi ay je pris le parti de faire duontor à l'ouïsme
 " celle que j'ai gardé, et par la même longue branche que j'y ay fait
 " mettre. le verre est une fois plus éloigné de l'œil qu'il n'est
 " quand il repose sur le nez et par cette position il grossit le objet, et je
 " j'ai lire aisément une demi doraine de pages in-octavo. sans
 " fatiguer l'organe, la lumière en affecte toujours moins. le soleil
 " tout avec le feu et la chandelle l'éprouvent encore un peu, le
 " larmoyement est tout à fait dissipé.

M^r le posteur M^r écrivit encore du 15 du mois d'août le 11 de
 son opération. " J'ai repris dit il toute mes fonctions pastorales sans
 " fâche de paye je les ay continuées jusqu'à présent sans interruption et
 " avec la dernière facilité, y'en eut hier la visite de M^r le
 " Docteur du b^e médecin du roi de prusse à Neuchâtel, qui ayant
 " examiné mon oeil opéré me dit qu'il n'y avoit pas la moindre
 " apparence d'un corps étranger dans la tige de la cicatrice, —
 " qu'il est si bien macéré qu'on n'en voit vestige, l'œil est
 " beau et bon.

Remarques & réflexions

Sans cet accident de la sorte de l'iris, j'avais tout lieu d'espérer un
 succès prompt de mon opération. rien d'ailleurs ne sembloit s'y opposer.

C'est l'événement n'en pas rare il n'en guère de praticien qui ayé fait souvent l'opération de la cataracte qui ne l'aye vû arriver.

plusieurs causes semblent favoriser dans cette opération la sortie de l'iris. car bien qu'on ne soit pas d'au usage de se servir du speculum oculi dans la méthode d'extraction, néanmoins on est indispensablement obligé de fixer le globe jusqu'à un certain point c'est le grand art de le faire sans comprimer qu'à le moins possible le globe. Dans les yeux miops ou saillants cette compression est plus facile, d'ailleurs le corps vitré peut être plus volumineux. De que l'incision de la cornée est faite je pense qu'on pour l'issue de l'humeur aqueuse & qui libère l'équilibre des humeurs de l'œil en perdue. ce qui joint à la sortie du cristallin lequel jette plus ou moins l'iris en débaut relativement à l'ouverture de celle-ci. Et au volume de celui-ci je veux dire du cristallin: il arrive même plus souvent qu'on ne pense qu'une partie de l'iris est emportée par le tranchant de l'instrument, particulièrement quand on se sert de l'instrument fait à la manière de M. Pons de av. la faye, Pezon, & Binet &c. et dans la méthode d'opérer l'incision de la cornée en portant l'instrument d'une partie latérale à l'autre et incisant de haut en bas. Ces effets me paraissent être produits particulièrement lors que dans le temps de l'incision de la cornée celui qui en charge de fixer la paupière fait une pression trop forte, et au supérieure ainsi que le globe, fait une pression trop forte, et au point de jeter le corps vitré en devant ce qui fait avancer le cristallin en devant vers l'iris. Et celle-ci se jette du côté de la chambre antérieure, ces effets aura plus aisément lieu si on n'opère pas avec célérité. et qu'on donne le temps à l'humeur aqueuse de se réparer toute ou en partie, avant que d'avoir achevé l'incision de la cornée.

Si en opérant on s'aperçoit que l'iris se jette sous le tranchant de l'instrument bien qu'en incisant en devant on ne presse l'iris. il ne faut point pour cela retirer le cristallin, si on ne retire l'instrument sans avoir incisé la cornée ainsi qu'on



qu'on se l'estait proposé. Combien de fois une partie de l'iris l'ho-
telle par été ôtée ou enlevée sans qu'il n'en soit résulté aucun
inconvenient y'en appellerais ici le témoignage de tous les praticiens
et de ceux qui ont levé sur l'opération de la cataracte par la
méthode d'extraction.

Lors qu'à près cette opération une partie de l'iris a été enlevée,
la pupille change de forme plus ou moins sensiblement relativement
au degré d'excès de la portion d'iris enlevée. Dans l'année
1776g. je fis l'opération de la cataracte en Suisse sur l'œil d'une
dame âgée de soixante-sept ans. Je partis vingt quatre heures
après l'opération. Six mois ensuite y'ai eu occasion de revoir
cette dame, j'ai trouvé son œil très bon. la pupille très dilatée
Le tiers de son bord inférieur me parut absolument enlevé. elle
n'estait susceptible d'aucun mouvement. je fis tout ce qu'on
a coutume de mettre en usage pour en faire l'épreuve, néanmoins
cette dame malgré son grand âge, porta le secours du verre que je
lui ay fourni, voit au point de pouvoir lire facilement et
écrire suffisamment pour mettre la mémoire toute ce petits affaires,
et sans le secours de lunettes elle pouvait distinguer les couleurs, les
figurs, et se conduire dans sa maison, et joindre du plaisir de la
promenade. il est vrai que cette dame me dit que lorsqu'elle
avait été une ou deux jours, se qu'elle fit la ma présence elle
estait obligée de se reposer, se sentant l'œil fatigué. le grand-
jour ne l'affectait point, il n'y avait tout au plus que la soleil
et la chandelle. la dame dont je parle avait la joue fort gros
et saillant, comme l'on dit à fleur de tête, y'observai que
avant l'opération l'iris était très mobile ou plutôt la pupille
laquelle se contractait, et se dilatait avec la dernière facilité.
La larme pour était cataract. mais la malade ne voulut consentir
qu'à m'en laisser opérer un qui fut l'œil droit que j'opérai de
la main gauche avec un instrument de Mr. Winslow. pendant

pendant cette opération, j'avois que je ne m'aperçus pas de m'être
 mis dans le cas d'avoir coupé & enlevé une partie de l'iris, aussi
 je ne m'inquiétais pas sur les suites d'un événement que j'ignorois
 absolument. il est vrai que dans ce cas on l'irriterait le plus
 et la sortie de l'iris. toute fois cependant, nous estimons que pour la
 perfection de l'opération de la cataracte il est très prudent d'irriter
 l'iris soit avec le tranchant, soit avec la pointe de l'instrument,
 et de prendre pour ces effets les précautions convenables. je
 n'ay présenté ce fait qui m'est arrivé que pour tranquilliser les jeunes
 praticiens et ne pas s'alarmer si ils s'aperçoivent en opérant
 la cataracte par la méthode d'extraction d'avoir coupé & dans
 l'incision de la cornée une partie de l'iris, et de laisser l'événement
 aux soins de la nature, puisque le plus souvent il n'en résulte
 aucun inconvénient.

Le changement de forme de la pupille peut avoir lieu
 non seulement dans le cas où l'iris a été intéressé pendant l'opération,
 mais encore à la suite de la sortie à travers la plaie de la cornée
 par la adhérence, qui il y peut contracter malgré le renouvellement
 de l'humeur aqueuse, qui semblerait devoir éloigner l'iris de la
 cornée et s'opposer à cette adhérence. cette difformité de pupille
 Gendron dans son excellent traité de maladies du yeux parlant
 de l'adhérence de l'iris, du changement de forme de la pupille
 arrive assez souvent après l'opération de la cataracte par
 extraction & on en a intéressé l'iris. Cependant les malades
 n'ont nulle difficulté de supporter le grand jour. mais seulem-
 ent une difformité à la pupille.

il est à remarquer, qu'il ne faut pas confondre l'état
 de la pupille lorsqu'une partie de l'iris a contracté de l'adhérence
 entre la corne & l'incision de la cornée, d'avec celui où le
 tranchant de l'instrument a enlevé une portion de l'iris. Dans le pre-
 mier cas la pupille est rétrécie et présente une forme plus ou moins
 ovale, allongée du côté de l'adhérence, qui est immobile, tandis



tandis que le plus souvent le vert de la pupille y voit de quelque mouvement. Dans le second cas qui est celui de l'iris irrité, la pupille reste plus ou moins dilatée. bien que l'air soit sensible à la lumière et pour lors même elle perd son mouvement, d'ailleurs en suivant successivement à la voie tous les points du rebord de l'iris, il est facile de voir s'il a été irrité. Ce s'affaiblissement de la circonstance de mouvement de la pupille vient sans doute de la section de fibres musculaires qu'on a cru y avoir observé pour la dilatation et la contraction. ainsi d'un côté l'innervation des fibres qui servent à faire contracter l'iris, de l'autre son rebord supérieur d'un son tiers inférieur, sont des causes bien suffisantes pour en augmenter considérablement l'ouverture.

il semblerait aussi que la lumière doit fatiguer davantage l'organe dans le cas d'opacité de l'iris, plus tôt que dans celui où le rebord d'une partie de l'iris a été enlevé. Cependant j'ai eu occasion de voir sans ces inconvénients l'un et l'autre de ces cas arrivés après l'opération de la cataracte, c'est à dire j'ai enlevé une partie de l'iris c'est le cas de la dame dont j'ai parlé. Dans l'autre il y a eu sortie ou issue de l'iris, c'est la circonstance où l'on trouve le malade dont j'ai analysé l'observation. comme je l'ay fait observer, ils jouissent l'un et l'autre de la lumière sans en être fatigués, ni incommodés. tous ces faits semblent se dériver toutes les explications physiologiques de l'usage de l'iris, et de la pupille. Cependant c'en n'est pas là, l'usage que nous prétendons faire de nos observations.

pour suivre l'analyse de circonstances de mon observation. y avoir que je ne tirai pas du moy même ainsi que je l'ai déjà dit un pronostic favorable sur le succès de mon opération. D'après cette sortie de l'iris j'avais à craindre que l'irritation, le traitement et le pincement de cette membrane n'attira quelque violence inflammation qui aurait pu se communiquer même dans l'intérieur du globe et le terminer.

par la plus étrange et la plus malheureuse de toutes les terminaisons. Je veux dire la suppuration. Terminaison de l'inflammation qui en quelque fois se dissipe dans tout autre circonstance. Dans ce cas c'est le globe tombé en fonte se dissout et le tout présente un corps d'œil très désagréable. Je ne dissimulerais point que ce fâcheux événement s'est arrivé à un homme à qui j'avais fait l'opération de la cataracte. Je, circonstance particulière, y donnerais lieu. car l'opération fut faite d'une manière y s'oppose à promettre tout le succès possible. C'était pour passer à tous ces accidents que j'aurais souhaité dans le cas de l'observation présente de pouvoir débarrasser l'iris d'entre les lèvres de l'incision de la cornée et procurer la rentrée dans la situation naturelle. Pour remplir ces vœux je consultais divers auteurs, et quelques personnes de l'art, les uns conseillaient d'emporter ou de couper la portion d'iris épandue au niveau des lèvres de la cornée, les autres de le faire rentrer avec une curette, d'autres enfin d'employer des colleres un peu adhésives, et tous présentant la chose comme aisée, facile. M. J. David s'expliqua ainsi. Si l'iris se trouve pincé entre les deux lèvres de la petite plaie, il est fort facile de le dégager en l'élevant doucement la cornée avec la petite spatule, quel que soit même le mouvement naturel de l'œil le faire rentrer.

il est encore plus facile de compter ceci pour un des merveilles de la chirurgie si à droit, au point de dire qu'il ont pu faire dans le cas de cataracte membraneuse, le tour de la membrane cristalline pour la couper en passant leur instrument et travers la pupille, d'autres ont aussi eu l'adresse d'aller chercher la portion de membrane qui se trouve au fond de la pupille sur le corps vitré, dans le châtelet du cristallin. Sachant combien dans le cas il serait imprudent de presser le globe de l'œil pour le tenir assésé, pour faciliter l'exécution de ces délicates manœuvres. Connaissant d'un autre côté quel est le degré d'irritation qui arrive à l'œil après la section de la cornée, et même l'impossibilité que le malade puisse souffrir, et supporter tant



de si viciieuses opérations, j'ose déclarer que je n'ai point de foy.
à tant de gêne & de douleur.

D'après le conseil de praticien je voulus essayer de faire rentrer l'iris
sorti à la suite de l'opération sous je vis de perdre mes deux tentatives
furent inutiles. après ce qui s'estant passé je fus encore moins d'avis de
l'effort de le couper, la douleur vive que le malade ressentit à l'instant
que je touchai à l'iris venait sans doute de la communication du
nerf dans le cerveau.

M^r Drouin ancien élève interne de l'hôtel Dieu de Paris &
présent chirurgien en chef de l'hôpital de Charbonnières auvergne,
d'un mérite très distingué m'écrivit que dans les opérations de cataracte
qu'il avait eu occasion de faire, il était arrivé à un de ses malades
à la suite de l'opération que l'iris s'était trouvé dans la plaie de
la cornée sans qu'il ayé pu le réplacer. " j'abandonnay dit il la
" tout à la nature plutôt que de pousser plus loin des tentatives qui ne
" peuvent être que préjudiciables au patient car, la plaie de la cornée en
" se réunissant à rétrécir l'iris qui lui était adhérente dans ces endroits,
" la cicatrice qui a été faite pendant quel que temps s'est
" affaiblie petit à petit au point qu'il y faut veiller de pres pour
" s'en apercevoir, et la malade voit fort bien de ces œil.

Sur le témoignage de M^r Drouin, sur le avis de M^r.
sur le avis de M^r Gujon et sur la grande ressource que j'ai trouvée dans
les auteurs dans cette circonstance, et d'après mes idées particulières
je me décidai à commettre la soin de l'événement à la nature
ainsi que je l'ai déjà dit. En effet, je crois que plusieurs causes
naturelles peuvent concourir au réplacément de l'iris. Si l'on
compte à ceux au moins d'une partie. 1^o il arrive toujours mais
avec plus ou moins de violence que soit la pression du globe, soit par
l'effort de l'instrument tranchant et piqueur pendant l'opération
que le globe se travaille même allongé, qu'il y a l'ébranlement
dans le corps vitré, qu'il se jette en devant, la sortie forcée d'un

D'un gros cristallin pour produire le même effet. Soit en passant à travers la pupille, ou dans la chambre d'entre l'opacité incisée de la corne. —
Toutes ces causes avouées nous déjà remarquées peuvent contribuer à faciliter la sortie ou l'issue de l'iris après l'opération. Mais si le malade a soin sur tout les 10 jours de tenir la tête dans une situation basse dans la lit. joins à la saignée et un grand repos, si d'ailleurs tout va bien les parties de l'œil reprendront leur place, leur ordre et leur équilibre, l'uvee pour ainsi dire reprendra son assise ordinaire même d'autant plus que le défaut de cristallin lui permet de se porter plus facilement en arrière vers la chambre postérieure suppose qu'il y en ait une. D'un autre côté le corps vitré se moue aussi plus à son aise ^{puis} qu'il remplit le vuide du cristallin.

2^e. Comme l'a fait remarquer M. de Monro. il couvrent de l'air l'œil libre. que la lumière affecte la pupille, au point de l'obliger à se mouvoir qui se bascule sous l'uvee, ou l'iris des principes de la zone de la petite plaque de la corne. 3^e. à mesure que l'humour aqueux se reproduit si la corne pour la rétrograder l'éloigner de l'iris dans toute la confiance, et d'un autre côté elle sera en l'équilibre avec le corps vitré la quel ne se portera plus si en devant vers la chambre antérieure. et par conséquent l'uvee pourra se jeter plus facilement du côté de la chambre postérieure. et par une suite nécessaire l'iris suivra son mouvement. On a vu l'effet que toutes ces causes ont eues, nous l'avons dit, il pourra se débarrasser de la plaque de la corne, de

J'ai dit que mon malade me marque trois semaines après son retour chez lui que son œil était beaucoup mieux, quatre mois après il me fait le détail comme on a vu ci-dessus de son état. et j'ai observé que quand le malade est parti la corne l'air s'en échappait une partie de l'humour aqueux par lequel il y avait les moyens. mais surtout on s'en était fondé à la croire parce que l'œil opéré paraissait beaucoup plus que l'autre, je pense que dans la suite la mouvance de l'iris pourra par

par l'ingression de la lumière, le chagrinement de paupières, le retour
 de l'apex du globe de l'œil. le tout aura contribué à la rentrée de l'iris
 au moins la partie jusque au bord interne des lèvr. de la cornée. que celle
 ci aura pu se cicatriser entièrement que de l'œil l'humour aqueux
 n'aura pas pu s'échapper. que la chambre antérieure se sera remplie.
 qu'en conséquence la cornée a repris sa tension, son élévation
 tombée en dehors ce qui constitue la forme ordinaire. qu'en fin
 l'obstruction des lèvr. de la petite playe de la cornée se sera peu à
 peu dissipée, au point de prendre exactement le niveau de
 la surface de l'œil. que l'on ne voit plus la trace de la cicatrice. que néanmoins
 cette cicatrice commence plutôt à l'intérieur de l'épaisseur de la lame
 de la cornée qu'à l'extérieur, que par conséquent l'os qu'elle
 commence à se faire elle contracte de l'adhésion avec l'iris
 qui y est encore légèrement prise. que pour lors, n'y le mouvement
 de la pupille, n'y la reproduction de l'humour aqueux, ne peuvent
 plus se régaler. C'est pourquoy la pupille garde ainsi que lors
 l'avant une figure irrégulière. aussi on a vu que même
 malade me marque que son œil n'a plus la prunelle ronde, l'on
 voit aussi que malgré ce défaut. N. le porteur tire tout le parti
 possible de son œil puisqu'il est vrai qu'il peut vaquer aisément
 à toutes les fonctions qu'exige un ministre ou un état ou la vie
 est absolument nécessaire et même fatiguée. on jugera aisé-
 ment par ce que je viens de dire que le moyen que nous proposons
 pour empêcher l'adhésion de la cornée à l'iris ou plutôt de celle
 à celle là, après l'opération de la cataracte ou il y a l'office de
 l'iris le moyen si je dois être mis en usage avant que la petite
 playe de la cornée commence à se réunir, l'os donc qu'on s'en
 appuie de l'événement au lieu de mettre sur l'œil un appareil
 avec beaucoup de symétrie, l'usage d'un bandage, il faut
 au contraire le laisser libre à peu d'échappée pour lui présenter de
 temps en temps des objets hauts en couleur qui puissent affecter la pupille
 pour l'obliger à des mouvements. nous avons tout de fois fait
 entendre l'effort qui doit en résulter, toutes fois nous entendons qu'on
 agisse de prudence sur un œil nouvellement opéré pour l'air et la lumière.

Les oculistes recommandent de que le cristallin s'en sorte de passer la
 cavité entre la lèvre de la plaie de la cornée pour se placer d'un côté de
 la, qu'elle ait été portée en devant la cornée pendant ce qu'elle soit
 utile, cependant d'un peu difficile l'exécution. Une fois ou deux ce fut ce
 que j'ai pu faire pour le venir à bout, tant il est difficile sur un œil qui
 vient d'être opéré. Si cette difficulté est considérable qu'elle oblige à
 presser le globe pour l'opérer il est encore plus prudent de ne pas y
 toucher. Je sçais aussi que les praticiens recommandent encore après la
 sortie du cristallin d'examiner s'il y a de portions membraneuses ou
 quelques lambeaux qui se présentent à l'ouverture de la cornée de la pincer
 et de la couper. Ces portions de membrane sont pour l'ordinaire quelques
 portions de la capsule cristalline. Je crois que dans ces cas constants il est
 très prudent d'apporter beaucoup de précautions dans ces petites opérations,
 quelques uns poussent si loin leur avis qu'ils conseillent d'aller saisir ces
 membraneux, jusqu'à derrière l'iris par l'ouverture de la pupille. Je ne
 puis me dispenser d'appliquer ici ce que j'ai dit cy devant à l'égard de
 ceux qui ont été si adroits que de couper la membrane cristalline dans
 toute la circonférence interne de l'iris. Lors qu'elle y est à l'entière je
 puis ajouter que c'est tout ce que l'on pourrait faire sur le jeu d'un
 cadavre. Je pourrais encore joindre parmi ces merveilleux l'idée d'un
 oculiste de Paris qui jouit de beaucoup de réputation. Entre plusieurs
 personnes que nous étions un jour il nous la donna comme neuve, l'ayant
 je l'ai trouvée aussi hasardeuse que nouvelle, à y avoir fait. Dit cet oculiste
 l'incision de la cornée. Je fis la pression convenable pour écarter le
 cristallin. mais dès qu'il fut au point de présenter son bris au entre
 la lèvre de l'incision de la cornée je reconnus qu'il était brillant
 transparent. Je l'instant je compris que le défaut de vision chez cette
 personne ne pouvait pas venir de l'obstruction du cristallin mais plus tôt
 de la membrane. En conséquence je la repoussai et la fis rentrer dans
 sa place. puis avec un instrument particulier y eulay la membrane
 cristalline qui était elle-même obstruée, et l'opération vint parfaitement.



parfaitement, nous aurions bien de raison à opposer à cette vaine
 et ingénieuse pratique. Mais nous la passons sous silence pour reprendre
 et poursuivre nos remarques au sujet de l'opération qui comme je
 l'ai fait observer a été consommée d'un succès bien au delà de ce que
 j'aurais d'abord prévu à cause de l'issue de l'iris. Je ne puis donc avouer
 d'après l'expérience, et fonde aussi sur la raison, que dans le cas
 de l'aphakie qui arrive à la suite de l'opération de la cataracte
 par la Méthode d'Extraction il est prudent d'en commettre l'issue
 aux soins de la Nature, pour à quelques petits secours de l'art, les
 tenir l'impression de la lumière, la reproduction de l'humeur aqueuse, le
 retour de l'assiette du globe, la disposition de la petite obstruction de bords
 de la cornée ainsi que je l'ai déjà marqué, serons assez de cause
 d'effets naturels qui rétablissent l'organe et sa fonction. En sorte que
 l'oeil ne sera point fatigué ni irrité, ainsi qu'il arrive lorsqu'en
 voulant faire le précepte décrit par les auteurs on s'avise de
 vouloir couper la partie de l'iris qui se présente au lieu de la
 faire rentrer dans la place, outre que les manœuvres sont
 difficiles, et délicates, elle peut se faire presque toujours sans
 succès. D'ailleurs j'ai fait observer que lors que l'iris soit
 intéressé et même une partie enlevée dans l'opération, soit
 qu'il se présente dans l'incision de la cornée ou qu'en suite
 il reste adhérent. Change la forme de la pupille, la vision se
 laisse par qu'on ne la fasse sans incommodité, il n'y a que le
 témoignage de l'expérience qui pu nous persuader de ce fait.
 au point que la vision puisse avoir lieu dans le cas d'une pupille
 qui est ordinairement ouverte, le tiers inférieur de son rebord
 enlevé et le reste sans aucun mouvement. Si ces succès
 doivent nous tranquilliser et relever les espérances de ceux qui
 s'adonnent à la pratique de l'opération de la cataracte, ils
 n'en doivent pas moins opposer tous les soins et toutes les précautions
 possibles pour éviter les plus grands événements.
 Sans prétendre intimider les jeunes praticiens je ne puis
 regarder l'opération de la cataracte, comme une opération

opération simple, aisée, et facile. Je la trouve au contraire pleine —
 d'inconvénients pour ne pas dire de dangers ou ne saurait trop recom-
 mander la nécessité de porter des attentions bien réfléchies sur toutes
 les circonstances de l'état de l'œil d'une personne qui se présente
 pour se soumettre à cette opération. Je pense que c'est n'en pas sans
 raison que je crois que c'est un grand bien pour l'humanité que la
 chirurgie vienne de réclamer une branche absolument de son
 domaine qu'elle eût semblé abandonner entre les mains de
 peu de moins instruits, et qui même n'ont jamais rien le moindre
 principes, je veux dire les empiriques. Et qu'on réfléchisse sur
 l'arrangement admirable du globe de l'œil, sur la merveille
 et l'excellence de son usage, on jugera qu'il ne faut pas moins
 que de performer de l'art même d'un savoir distingué pour y
 pratiquer la opération convenable.

Quoy qu'il n'y aye que deux manières d'ouvrir la cornée dans
 l'opération de la cataracte par l'extraction, savoir par la partie
 latérale, et par la partie inférieure, néanmoins on s'imagine
 ces diverses manières une infinité d'instruments différents, pour procéder
 à l'une ou à l'autre de ces deux méthodes, le nombre et cette variété
 d'instrument est une preuve de l'émulation et des travaux de
 performer de l'art sur cette opération, nous ne ferons point l'analyse
 de tous, tout ce qu'on peut dire de plus précis, c'est que ces instruments
 ont la uns, et les autres des inconvénients et des avantages, la variété
 d'opinion. L'habitude doit en décider le choix. Je conviens cepen-
 dant que si c'étoit, etais le produit de l'analyse, de l'appris de
 combinaison de la réflexion, il seroit sans doute plus avantageux;
 d'après tout il me paroît assez peu d'avantage sur la préférence de
 tel ou tel instrument, une main adroite et dirigée par une bonne
 particulière perfectionne bien l'instrument. Ceci pourroit se
 rapporter à cette expression vulgaire que jamais on n'ouvrit l'œil
 trouvé mauvais oculist.

Je viens de dire qu'il n'y a jusqu'à présent que deux méthodes
 d'ouvrir la cornée qui sont par la partie latérale, et par la partie inférieure.



inférieure, la j'ai présentée à un oculiste de difficulté, vu qu'il convenait
 d'opérer l'œil droit de la main gauche. Bien qu'on s'opère qu'un chirurgien
 doit être ambidextre. Cependant il en est peu qui ayent la même facilité
 de se servir de la main gauche comme de la droite, soit pour éviter
 ces inconvénients, soit pour que le corps vitreux & même l'humeur aqueuse
 n'ayent pas tant de facilité à sortir, quelques praticiens s'imaginent qu'il
 est plus avantageux d'opérer le malade couché sur le dos, l'opérateur
 se place d'envisager la tête sur tout pour opérer l'œil droit, m. Broun-
 que j'ai déjà cité principal chirurgien de l'hôpital de Charenton
 m'a écrit dernièrement en me montrant qu'un certain oculiste
 d'origine nommée Tadini, avait opéré quelques personnes à Charenton
 du cataracte avec un succès complet et fort habilement. Voici mon
 à mot, ce qu'il m'a écrit sur ce qu'il m'avait prié de me marquer
 la façon de procéder sur l'opération de la cataracte m. ma méthode
 n'est celle de Vincent à laquelle je fis quelques changements, l'on que-
 rit y'en ait opéré à l'hôtel de ville de ce prison un nommé Tadini :
 22 son oculiste italien qui passa ici l'hiver dernier, 1770. et
 22 opéra trois fois la notre prison, je vous avoue que je n'ay
 22 jamais vu rien de si l'esta, et ce qui vous paraîtra plus singulier
 22 ce qu'il opéra les deux fois de la main droite, la gauche excepté
 22 le pince lui ayant été apporté autre fois par un coup de fusil
 22 voici la façon, qui depuis lui la même, il fait élever tout
 22 simplement la paupière supérieure avec un doigt ou deux
 22 il place ensuite son pince gauche sur la partie inférieure du
 22 globe de l'œil, presque à l'opposite de l'endroit où il doit
 22 plonger son instrument, il fixe le plus possible le globe avec
 22 son pince qu'il appuie très fortement, et de qu'il a commencé
 22 la ponction avec son instrument et l'endroit ordinaire, il le
 22 porte si promptement jusqu'à ce qu'il a percé de la corne que
 22 l'iris n'a pas le temps de se présenter sous le tranchant : l'incision

- 22 faite il divise la membrane cristalline avec le bistouri de sur de lo
 22 foye et par une légère pression sur le globe il fait sortir le cristallin.
 22 On tire avec une cusette d'or quelques portions flottantes de membranes rétablies
 22 L'on tire avec la même cusette au cas qu'il y aye quelque dérangement
 22 tousse après cela son malade à l'opérateur de jour lui fait distinguer
 22 plusieurs choses qu'il lui présente. On pense même est très facile un seul
 22 linge en double imbibé d'une liqueur convenable, telle qu'un peu
 22 d'eau salée ou d'eau commune et posé avec chatouillement sur
 22 l'œil sans aucune compression lui fait tous les traits. Il fait avorter
 22 ce linge toute la fois qu'il commence à sécher. Il laisse ainsi son
 22 malade pendant sept à huit jours après quoy il le fait lever. Il ne
 22 néglige cependant pas le remède général. ce que vous avez joint
 22 à votre lettre que l'œil doit quel qu'enfoncé qu'il soit s'opérer
 22 très facilement par dessus le nez qui sert de point d'appui à l'instrument
 22 même. Notre oculiste fait tous ces cas de vers le petit angle et
 22 trouve par ce moyen d'ailleurs de la facilité à pénétrer son instrument

La même oculiste a été connu à Constantinople par un de
 mes amis lequel m'a raconté qu'il y jouissoit de beaucoup de
 réputation pour guérir les cataractes. quoy qu'il en soit j'ai eu
 de voir rapporter ce qui m'a été communiqué touchant la manière
 d'opérer de l'oculiste turc. Comme pouvant être de quelque
 utilité. j'ai dit devant que le choix de l'instrument et leur
 préférence de uns sur les autres influent moins sur la succès de l'opération
 que l'habileté de la main jointe au savoir. Cela est si vrai
 qu'à voir tous les instruments qu'on s'imagine jusqu'à présent on
 pourroit en avoir de très bons et de très mauvais. j'ai toujours pensé que le
 plus grand point de la plus grande art de l'opération de la cataracte
 se trouve dans l'œil sans presser le globe lequel sans cette
 grande mobilité et sans le danger qu'il y a d'avoir que la
 pression se fasse l'opération la plus aisée est la plus facile de
 toutes celles qu'on pratique sur le corps humain, la saignée même
 pratiquée si souvent et si hardiment présente plus de difficulté.

de difficulté. je ne doute pas non plus que l'on qui est arrivé que l'opération de la cataracte en puisse quelque fois d'accident fâcheux qu'il n'en soit des le, les souvent au mauvais manœuvre de l'opération, j'ai vu bien de fois l'œil fatigué. la main tremblante, & par porter l'instrument ou tout hasard dans le globe, d'autre fois l'incision de la cornée faite sans précaution de crainte par un plissement des ligaments ciliaires & ce qui peut attirer de l'irritation, l'inflammation même du globe qui amène une chaîne de maux si fâcheux qu'il n'est le terminus quelque fois que par la fonte de l'œil.

La très petite incision de la cornée est également nuisible. La cécité se fait avec difficulté. l'opérateur est obligé d'être de pression toujours à craindre par le dérangement qui peut arriver sans le corps vitré & le renouvellement de l'uvée. aussi que l'irritation de tout le globe. quoy que j'aie prouvé par des observations que l'issue de l'uvée en la section d'une partie n'a jamais suivi d'aucun accident fâcheux, il est cependant bon de croire que quelque fois on s'interessa & on ne s'occupe pas suffisamment cette partie. aussi d'avoir pour conseil de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas y toucher avec l'instrument tranchant. Ceux donc qui s'appliquent à chercher des moyens propres à fixer le globe de l'œil pendant l'opération, sont je pense plus utiles, & plus utiles, que ceux qui cherchent à multiplier, à changer & à varier les instruments propres à faire l'incision de la cornée, quoy que la suite de ceux de ceux pour toujours donner. & tant qu'ils sont de contribution à perfectionner & à rendre plus sûre l'exécution d'une opération, tant utile qu'admirable par les effets que delicate dans la manœuvre & dans la direction.

il importe aussi beaucoup d'avoir un aide intelligent & adroit pour fixer le globe & élever la paupière supérieure, il est prouvé de la bien dresser à ce qu'il doit faire avant l'opération. —

L'opération, quelque fois le sort du malade et la réputation du chirurgien
 est entre ses mains. Je suis fâché d'être obligé de conseiller même
 que l'aide qui doit faire la fonction sous je viens de parler ayez
 de la probité ou soit attaché à l'opérateur. Je tire le rideau sur
 les exemples que je pourrais rapporter du mal qui a résulté pour
 n'avoir pas pris cette précaution ou pour avoir été sans confiance,
 chacun sait à quel excès peuvent porter la jalousie et l'ambition

un autre point assez important. Ici que l'incision de la cornée est
 faite le cristallin pour l'ordinaire suit de près par la seule impulsion
 du globe et de ses muscles, et se laisse d'équilibre des humeurs par
 la résistante perdue. Bien de fois la membrane cristalline résiste et
 le cristallin reste dans la place, dans ce cas le praticien ne doit point
 se presser il doit rester un moment tranquille ainsi que le malade son
 sang se forme, et faire volontiers la sacrifice de cette petite
 gloire qu'il soit dit que Mr. un tel a fait l'opération dans l'opacé
 de tant de minutes ou de secondes, monter sur table. Ce point d'honneur et
 cette gloire malheureusement trop ambitieuse se rend plus que d'une
 fois des opérations sans succès et funestes aux malades. L'opération
 de la taille seule pourrait en fournir bien d'exemple. Ici ce proverbe a
 on a toujours assez tôt fait quand on a bien fait. il est plus utile et plus
 glorieux que la opération soignée couronnée du succès que de se le vanter
 d'avoir l'opération au moins celle qui n'en soit pas susceptible.

par cette petite attente le malade reprend haleine, le globe de
 l'oeil fatigué reprend aussi une partie de son affaiblissement, l'action des
 muscles, celle du corps vitré qui n'est plus en équilibre avec l'humeur
 aqueuse contre balancé à l'expulsion du cristallin, telle est que la
 plus souvent au bout d'un moment, les ouvrages les plus délicats, l'on
 a pressé ce corps se présente dans la tétra de l'incision de la
 cornée, et à la faveur des plus légers mouvements de la corne il
 sort entièrement. Si après un court espace de temps le cristallin ne
 sort entièrement pas même à la faveur d'une douce pression, il est
 plus de la décider à ouvrir la membrane cristalline, cette petite



petite opération faite on laisse reposer l'œil un moment, si le cristallin ne se présente par son usage la pression va commander, y'ai vu quelque fois dans l'attente de voir se présenter le cristallin sans toucher à l'œil par de cinq minutes, je n'ai pas eu lieu d'en être fâché et cela soit à six ou sept après l'ouverture de la membrane cristalline qu'on elle a été nécessaire.

Il n'en parait dans ce livre de voir de oculiste, méthodique. Je dis penser de présenter d'abord après l'opération quelque corps à distinguer au malade, cette curiosité lui toujours déplacée, et peut être nuisible, elle avait autre fois son utilité relative à l'opération de la cataracte par abaissement pratiquée par les empiriques. Le cristallin abattu par l'aiguille laissait la pupille nette, et le malade pouvait distinguer, après cela l'appareil était mis par ces deux organes. Compté trois jours après la plus part des cristallins remontaient dans l'œil placé et pouvait faire la fortune d'un second oculiste, la méthode d'extraction ne leur lit quelque fois par moins favorable néanmoins de que le cristallin en sorti le malade pour apprécier ce voir et même distinguer les objets et en l'attente d'avoir recouvré la vue, l'oculiste empirique se fait donner le honneur ainsi qu'il en est convenu trois jours après au plus tard il port. l'inflammation, la douleur, arrivent à l'œil opéré et enfin on ne pouvant il en tout à fait perdu, il n'en guère d'endroit où l'on ne trouve de victimes de l'ignorance de la plus part de ces malheureux qui courent le pays sous le titre fameux d'oculistes qui ne manquent jamais de raisons pour surprendre la confiance du public.

Il y a deux méthodes au je dois dire d'inciser la corne de l'opération de la cataracte, aux quelles pour les distinguer je donne le nom de méthode latérale et celui de méthode inférieure, nom non moins affectueux sur la différence de ces deux méthodes, les incisions que j'ai observé en faisant la méthode latérale ainsi que la pratiquent la plus part des praticiens tel que vous la savez, l'un de ces a par là, et l'oculiste vinet qui jouit de beaucoup de réputation quoy qu'empirique il mérite

il mérita des Eloges, pour sa Dextérité il seroit bien plus loisible si
 dans la suite il produisoit quelque traité utile relatif à l'opération de
 la cataracte, ou au moins des observations intéressantes, mais nous n'avons
 vu jusqu'à présent que les chirurgiens s'éclairer, et méthodiques qui ayent
 enrichi et avancé le progrès de cette partie de la chirurgie. Si inconve-
 nient si j'ai dans la méthode latérale sous laiffi culte de fixer le
 globe au point de pouvoir porter hardiment l'instrument dans le point de
 la cornée convenable. le second lieu celle de la traverser en passant dans la
 chambre antérieure, et de faire sortir l'instrument du côté opposé. j'ai
 vu l'œil tourner tellement du côté du nez, que le praticien paroissoit
 de vue la pointe de son instrument et le conduisant au hasard, il est
 facile de concevoir dans ce cas combien on risque de piquer l'iris, et
 la conjonctive et même le globe lui-même. Et n'est pas surprenant
 que ces sortes d'opérations soient accompagnées d'événements fâcheux,

mais en supposant qu'on veuille et sans inconvénient l'opérateur
 aye traversé la chambre antérieure il est question de finir l'incision
 de la cornée. pour ces effets il faut diriger l'instrument de haut en
 bas, en inclinant le tranchant de derrière en devant. C'est dans ce
 mouvement ou j'ai vu aussi naître de grandes difficultés. j'ai vu le
 globe de l'œil se tourner sous la main du supérieur, au point que
 la cornée n'estait plus visible. de là on peut juger aisément qu'il
 est très difficile de finir l'incision de la cornée dans l'endroit précis ou il
 conviendrait de la faire. on risque même d'insérer le planus cicatrice, et l'iris,
 et combien de maux ne peut-il pas en résulter.

Je conviens cependant que ces inconvénients arrivent rarement en
 apportant dans l'opération par la méthode latérale les précautions
 convenables. 1. il est à propos de bander l'œil opposé quant même
 il seroit cataracté d'y faire une pression par le moyen de quelques compresses
 assez forte sans néanmoins le serrer. on juge d'abord qu'avec dessein en
 en fixant l'œil opposé à celui qu'on se propose d'opérer d'en arrêter aussi
 par l'application le mouvement. 2. recommander au malade pendant
 l'opération de tenir son œil fixe. 3. former comme si l'œil étoit toujours
 dans la même position. 4. de bien disposer l'aide qui sert à fixer le globe
 et à tenir la main supérieure. 5. l'opérateur lui-même peut



peut contribuer pour beaucoup à le rendre l'opération aisée, facile.
 5.^e Sit arriva qu'en finissant l'incision de la cornée le globe se tourne
 en la bras, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, il
 conviendrait de ne point se presser de porter au point où l'on s'est mis, on
 recommande au malade de faire un effort pour redresser son oeil, et le
 fixer comme s'il voulait regarder vers le haut. Ce moment ne tarde
 pas d'arriver l'on en doit profiter pour finir l'incision de la cornée,
 ces difficultés ont été prévues par les praticiens. Le instrument qu'il en
 imagine pour fixer le globe sans le comprimer que jusqu'à un certain degré
 ainsi que la paupière supérieure. Le prouveur était sûr, mais jusqu'à
 d'aujourd'hui je ne vois pas qu'on aye rien découvert de bien utile, ou du
 moins qui ne soit susceptible d'innovation la quel l'important sur la avant
 -ges. Aussi voit on presque tous les praticiens se contenter de leur doigt, et de
 l'écrou d'un aide. Soit pour fixer l'œil. Soit pour relever la paupière
 supérieure.

Dans la dernière opération de cataracte que j'ai faite je
 me suis servi d'un instrument particulier pour fixer le globe et la
 paupière supérieure. C'est un instrument oultre je de l'ancien *operculum oculi*
 en fait d'un fer très doux on peut courber son manche ou longue
 branche à volonté. On aurait la même facilité en le faisant faire
 d'argent recouvert la partie qui présente un demi-cercle ou arc de cercle
 en un peu courbée postérieurement, et garnie d'un linge long et fin
 de petite grandélette, on peut garnir aussi cette partie de l'instrument
 avec du coton couverte d'une peau douce. pour bien placer ces instrum
 -ent il faut le donner à tenir à un aide intelligent après l'avoir posé
 entre la paupière supérieure et le bord inférieur de la portion coronale
 de l'orbite. tellement qu'on doit sur cette partie former le point d'appui
 de l'instrument pour ménager la compression du globe. il n'a pas
 que la présence de cet instrument la paupière supérieure est suffisante
 élevée et soutenue, ainsi que le globe de l'œil. l'instrument agit par sa
 longue branche ou le manche se trouve au haut du côté de l'œil et de la
 la partie concave du côté du sourcil et du front. on peut l'éloigner du

Du front d'en dedans porter cette branche plus ou moins le devant selon
 que le globe de l'œil se trouve vu plus ou moins en dessous. A mouvement
 influe à porter le demi cercle placé sur et entre la paupière et l'orbite
 plus ou moins en dedans par conséquent à faire plus ou moins de pression.
 L'habitude la vue de l'instrument le apprendront à l'abord plus que ce
 je pourrais en dire. je ne dissimule point qu'il peut être susceptible de
 plus de perfection. je ne le donne pas non plus comme un instrument
 parfait sans défauts et inconvénients je l'ai fait aux maîtres de l'art
 à juger de son utilité. En du cas qu'on en peut faire. pour moi je le
 répète je ne m'en suis servi qu'une fois il m'a été utile. j'ai vu en
 vouloir essayer beaucoup d'autres instruments qu'on a imaginés, je leur ay
 trouvé à tous moins d'utilité que celui que je présente et plus d'incon-
 vénients. je répète encore aussi que le grand point dans l'opération
 de la cataracte d'air de pouvoir trouver un moyen aisé avec le quel
 on peut fixer sur le globe et la paupière supérieure sans le
 comprimer au moins qu'à un léger degré, pour l'ouvrir tout
 à l'aise (par manière de dire) quelconque on ferait l'incision de
 la cornée avec facilité.

L'instrument placé l'opérateur à l'ordinaire fixe la paupière
 supérieure, et concourt aussi en même temps conjointement avec l'instrument
 inférieur par un aide à fixer le globe et faire l'opération de l'œil en
 main par la méthode qu'il a projeté soit latérale, ou inférieure.

il peut arriver aussi dans la manière d'ouvrir la cornée par la
 méthode latérale que quand l'opérateur a traversé avec son
 instrument la chambre antérieure. s'il n'en pas bien tranché
 et dirigé l'opérateur à droitement pour terminer l'incision
 non seulement le globe peut se porter en l'air et se cacher comme
 il a été dit. mais encore la cornée offrira beaucoup de résistance
 au tranchant de l'instrument. le globe se en tiraille, & allonge
 ce qui peut déranger le corps vitré faire porter l'œil en devant.
 le enfin rendre la suite de l'opération fâcheuse. on peut parer



parce à ces inconvénients par la célérité l'au l'opération, et la l'intérêt
en ayant soin d'avoir des instruments bien tranchants et ou la lame soit
mince et même étroite. et lors le pectin estant mouillé d'huile
la résistance.

On donne comme une perfection dans l'opération de la cataracte par la méthode latérale de faire l'incision de la cornée dans la limite des cornées, pour que la cicatrice de la cornée transparente ne nuise pas dans la suite à la vision qu'elle laisse la pupille nette. et le passage libre des rayons lumineux. Je crois utile à ces éty end de faire remarquer que je trouve des inconvénients dans cette perfection qui m'ont été signalés par la raisonnablement et par l'expérience.

1^o. de former l'incision de la cornée si bas on peut se mettre dans le cas de piquer et d'inciser le pleur ciliaire ce qui peut produire des irritations, des inflammations toujours à craindre. 2^o le plus souvent après l'opération il survient à la conjonctive qui recouvre la sclérotique une inflammation plus ou moins considérable, si elle est portée à un haut degré elle gagne facilement le bord de la petite plaque de la cornée, et par conséquent la cornée elle-même de là elle peut se porter jusqu'à l'iris et s'effondrer sur toute la membrane choroïde. d'où il peut résulter de graves accidents.

3^o si l'iris vient à se présenter à l'ouverture de la cornée, il peut s'y loger plus facilement ce qui est toujours un inconvénient notable.

J'ai ailleurs vu, et j'ai fait des opérations sur l'incision de la cornée fluissais à une distance considérable du ligament ciliaire, sans que la cicatrice aye porté le moindre obstacle à la vision, il en même à remarquer que cette cicatrice brève n'est visible en y regardant de très près six mois ou un an après l'opération. Si c'est la fin par la méthode inférieure j'ouvre la cornée ainsi que les docteurs et grand Jean la pratiquent et d'autres oculistes, et que je l'ai pratiquée ou pour s'en à ces pour obliger aux

aux inconvénients que je viens d'enoncer par les l'instrument seul même
au tiers inférieur de la partie inférieure de la cornée

la manière d'ouvrir la cornée par la méthode inférieure dans
l'opération de la cataracte a' aussi les inconvénients et les avantages
j'ai observés par ce qui m'en arrivait en faisant cette opération en
commençant l'incision par la partie inférieure de la cornée et par
l'expérience d'autrui que dans le moment qu'on pousse l'instru-
ment dans la cornée, le globe de l'œil fait une espèce de saut d'un
vers le haut, et l'on que la pointe de l'instrument est parvenue dans
la chambre antérieure il en question d'agrandir suffisamment
l'ouverture de la cornée. On la dilate tant on incise sur les côtés, alors
le globe se porte tantôt en dedans vers le grand angle, tantôt en
dehors du côté du petit angle, on peut passer à ces inconvénients
de la première la précaution recommandée ci-dessus pour la méthode
latérale, il m'a semblé reconnaître quelques avantages dans la
manière de faire l'opération de la cataracte par la méthode infé-
rieure sur la méthode latérale; dans la première le globe n'est
point allongé, n'y travaille par la résistance de la cornée, l'œil n'est
pas si exposé à être intéressé, mais particulièrement à avoir une
perte de son bord emporté, l'œil n'est point si exposé à être vuide
par la sortie d'une partie ou de tout le corps vitré, la cristalline
l'inflammation pour moins à craindre après l'opération.

quelques sentimens de réputation entre lesquels se trouve particulière-
ment un grand jeun ou l'ouvroir la méthode inférieure ou celle
de Mr. Davis. Le premier la porte à un certain degré de
perfection, soit en changeant le instrument, soit pour en avoir diminué
le nombre. Mr. le docteur Mr. en chirurgie de Paris de l'academie royale
de chirurgie d'un mérite très distingué, c'est le seul qu'il ait profité.
-effort de l'école pratique de chirurgie pour les opérations, j'en faisais
la manière d'ouvrir dans l'opération de la cataracte la cornée par
la partie inférieure. pour ces effets il imagina des instrumens
particuliers fort ingénieux qui parussent remplis à trois tous
les indications.

quant à la méthode latérale, elle doit la plus grande perfection



aux célèbres M^{rs} de la faye, et Penon, la plus part des autres instrument
sous d'écrites de ceux de ces grands chirurgiens.

pour en revenir à la méthode inférieure. Mr. grand jean que j'ai
eu l'avantage de voir d'opérer quelque fois. employe ordinairement
deux instruments pour faire l'incision de la corne qui sous la trofse est la
langue de corps mais quelque fois il n'emploie que la trofse. avec ces
instruments il fait la ponction dans la corne et l'ouvre en incisant de
côté et d'autre autant qu'il l'estime nécessaire pour faire une
ouverture propre à l'air passer librement le cristallin. j'ai trouvé cette
manière d'ouvrir la corne fort simple quoiqu'elle soit difficile. car il
ne faut pas se flatter de pouvoir par cette méthode inciser la corne
d'une manière nette, égale et unie. N'y a même tout d'fait dans les
points où l'on voudrait bien. j'ai aussi trouvé de difficultés, et allongé
l'opération que de se servir de deux instruments. je l'ai dit l'œil est si
mobile si susceptible d'irritation. qu'il n'est pas aisé de changer
d'instruments. ou de moins de la faire sans perdre un temps précieux.

quoique Mr. grand jean opère avec succès, et que la trofse soit
bien imaginée. Je décide à ne me servir que d'un seul instrument
par la méthode inférieure. Comme on le pratique dans la méthode
latérale, il m'a semblé que la trofse de Mr. grand jean couvrant
après pour faire la ponction de la corne et pénétrer jusqu'à dans la
chambre antérieure. mais qu'elle n'est pas aussi commode pour étendre
suffisamment l'incision de côté et d'autre par ce que ces instruments ne
paraissent d'abord trop longs qu'il faut la corne. qui oblige à divers répri-
ses pour finir l'incision ce qui fait comme autant de coups inégaux
que l'œil peut être irrité assez facilement. qu'en fin il n'est
pas aisé de donner à l'incision de la corne la forme d'un cône
cylindrique que j'ai voulu. C'est sans l'intention de diminuer et de tacher
de vaincre ces et ces inconvénients en faisant l'opération qui fait la
plus précieuse de cette observation par la méthode inférieure
que je me suis servi d'un instrument que j'ai annoncé être
particulier. Lequel n'est autre chose qu'un petit bistouri sous
la lame et le tranchant en fait la manière de lancette, ayant

de l'instrument. C'est pour remédier à ces inconvénients que mon instrument est un peu convexe & qu'il y a une vive arête opposée saillante au milieu de la face convexe le tout pour éloigner l'iris de son tranchant latéral. C'est aussi à la faveur de la convexité que le bord tranchant donne toujours une forme de an circulaire à l'incision de la cornée. Ce qui est avantageux pour lier le lenticule ou le convexe de l'incision pour la perfection de l'opération.

Telle est la manière dont je me suis servi de l'instrument que j'ai proposé dans l'opération de la cataracte de sur le porteur la vue de cet instrument pourra faire juger plus aisément aux maîtres de l'art de son utilité & de sa bonté. L'opération a eu tout le succès désirable comme j'ai vu faire observer. L'inconvénient de la sortie de l'iris ne doit pas être attribué à ma méthode ni à la méthode inférieure. ni à l'instrument, puis que ces accidents arrivent par toutes les méthodes & avec tous les instruments.

quelque méthode que l'on suive pour faire l'opération de la cataracte il me semble qu'il tirerait avantage de monter le long de l'instrument sur une tige assez forte par l'emploi d'argent battu à froid & bien recuit ou un fer très doux et bien poli, elle aurait assez de solidité. et l'on pourrait donner au instrument la tournure plus ou moins droite ou courbe au moment de l'opération, et cela s'étendrait à la saillie de l'œil et à son enfoncement, à la disposition de l'orbis &c. je crois également que toutes ces différences devraient régler le choix de préférence dans la méthode de faire l'opération de la cataracte. qu'enfin ce la ne devrait pas être par goût ou par habitude. mais plutôt par combinaison, réflexion & en conséquence. il conviendrait d'opérer celui ci par une méthode et celui la par un autre. ainsi que dans l'avant dit suivant la disposition et la conformation de l'œil et de la partie environnante.

je ne voudrais pas passer une réclamation qui me paraît assez importante. c'est par tout dans la méthode latérale de faire l'opération de la cataracte. qu'avec l'instrument l'opérateur

est sur le point de descendre de finir l'incision de la corne, ou tout
au moins d'avoir l'instant qu'elle en finit, de se commander à l'aide
qui ferme la paupière et le globe assujettis de retirer ses doigts et
de laisser l'œil libre. C'en est l'effet, le moment le plus critiqué,
le plus à craindre que le corps vitré ne se chape, ce qui consti-
tuait ce qu'on appelle l'œil crevé, accident de plus malheureux pour
le malade et très nuisible à la réputation du chirurgien. Outre
l'inquiétude que la sensibilité de l'humanité ne permettrait pas
d'étouffer dans une âme bien née, qui voit à l'avantage le
plaisir d'être utile et de manifester l'excellence de l'art, que
l'appareil du guai.

à la vérité dans la dernière période de l'incision de la corne
il arrive comme je l'ai déjà dit que le globe est allongé, et que
d'ailleurs la pression, l'action des muscles, l'état de mouvement
tonique ou il se trouvent, et l'on pourrait ajouter tout le corps
du malade. qui comme l'on dit vulgairement à plus de peur que
de mal. Tous ces effets sont tels que j'ai souvent vu suivre, en
forter avec impétuosité le cristallin aussi tôt que l'humeur
aiguë. L'instant d'après l'incision de la corne, combien de
fois il n'est-il pas arrivé faute de précaution que l'œil s'est
vuider par l'issue du corps vitré qui est la seule partie qui soutient le
globe dans la forme après l'opération. Je sçais qu'il y a de
l'observation qui prouvent que bien qu'une partie du corps vitré se
soit vuider, néanmoins la opération s'est réussie. Je croi la chose
fort douteuse. peut être aura-t-on pris pour le corps vitré l'humeur
noirâtre qui sort après l'écoulement de l'humeur aiguë, dont
les jeunes praticiens ne doivent pas s'inquiéter si même ils voient la
première compression de leur appareil faite par cette humeur.

Je terminois mes remarques réflexives au sujet de
l'opération de la cataracte et de mon observation. Je fais observer
que non seulement ainsi que je viens de le dire l'œil peut se vuider



L'instant d'après l'opération mais l'œuvre faite de soins le
 malade pour être exposé à ces accidents les premiers jours qui
 suivent l'opération. indépendamment de l'inflammation qui peut arriver
 et être portée au point que le globe tombe la suppuration est la
 suite. ainsi, soit pour éviter le fâcheux événement, soit pour
 le prévenir. Nombre d'autres qui l'accompagnent que l'op-
 ération de la cataracte, il est très prudent en
 se préparant de ne point négliger d'y mettre en usage les moyens
 convenables pour les prévenir, tels sont la situation, la saignée,
 la diète, la liberté du ventre, une grande tranquillité, et les
 soins locaux pour l'œil. il vaut mieux pécher par excès de
 précautions que par défaut. j'avoue qu'il m'est arrivé
 quelque fois d'avoir eu lieu d'être fâché de m'être conduit
 autrement envers mes malades. l'exemple de quelques oculistes
 empiriques qui pratiquent cette opération sans aucune pré-
 paration avant ni après. Mettent à fuir le malade et l'opé-
 ration (s'il en faut fuir) ou est très souvent dans le cas de se rejeter
 de leur saignée, l'on a vu de particuliers faire des lieux de chemins
 à pied pour venir trouver un oculiste empirique qui l'amène
 dans quelque ville, ainsi que l'on leur continue qui leur fait
 sur le champ l'opération et le renvoie d'abord d'après, il en
 arrive que pour un à qui il n'arrive rien d'extraordinaire
 plusieurs autres en feront la victime par la perte de leur yeux,
 ou par des douleurs qui peuvent les conduire à de souffrances cruelles
 ce malheureux étant sans secours leur sort est encore plus
 à craindre. cette manière de faire pas tout au plus possible
 dans le cas où l'opération de la cataracte a été faite par
 abaissement. au moins par la marche. par le mouvement de la tête
 et du corps l'œil ne voit que par de la vuide, quoi que

quoique je ne me fus d'abord proposé que de donner simplement l'observation de l'opération de la cataracte dont j'ai détaillé les circonstances relatives à la forme de l'iris, & l'adhérence de la pupille et aux forces sous elle & été suivie. j'ai cru ne pas sortir de la sphère de la matière en étendant mes remarques sur d'autres objets relatifs comme l'on peut le juger à l'opération de la cataracte. j'ai également cru que ces remarques pourraient être de quelque utilité aux jeunes praticiens. Il m'a paru que les plus jans sous ces intéressantes et même qu'ils ne sont pas toujours consignés dans les ouvrages de grands maîtres qui ont écrit sur l'opération de la cataracte.

Les principales vues que je me suis proposé de communiquer dans cette observation et les remarques que j'ay ajoutées, sont : 1.^o de faire voir ce qu'il y a de mieux à faire dans le cas de l'issue de l'iris après l'opération. 2.^o de faire connaître les réponses de la nature dans cette circonstance. 3.^o que ces accidents n'y ont l'adhérence de l'iris n'y une porte de sa section nous pourrions empêcher la réussite de l'opération. 4.^o qu'il en est au moins très prudent de se mettre en garde contre ce événement. 5.^o qu'il y a des précautions à prendre dans la sortie du cristallin. Dans l'incision de la cornée pour éviter l'issue du corps vitré. 6.^o que le choix de la méthode pour ouvrir la cornée devrait se régler sur la manière d'être de l'œil. 7.^o de faire connaître les avantages et les inconvénients de deux méthodes d'ouvrir la cornée. 8.^o de ne pas faire l'incision trop près de la sclérotique et du cercle ciliaire. 9.^o j'ai eu du vœu de faire entendre. Combien il est nécessaire de prendre de mesures et de précautions avant pendant et après l'opération. 10.^o plusieurs petites considérations utiles que le lecteur aura dû observer dans mes remarques. et la fin j'ai cru simplifier la méthode



De Mr. Savic. ou la méthode inférieure d'ouvrir la cornée en
présentant l'instrument sous l'œil qui est dérivé de la
tresse de Mr. grandjean oculiste de Paris.

fin

note

nous ferons remarquer qu'en se servant de l'instrument qui nous est
particulier pour l'opération de la cataracte dont nous avons parlé
page 29 & 30. qu'il peut arriver qu'en voulant agrandir suffisamment
l'ouverture de la cornée avec le tranchant latéral de l'instrument
que la globe tourne ou du côté du petit. ou du côté du grand angle de
l'orbite au point d'engager l'exécution facile de l'opération —
nous croyons qu'on peut aisément et sans danger remédier à cette
difficulté en se servant d'un petit crochet moufle fait d'un fil —
d'organs raciné qu'on peut plier à volonté. et l'introduire dans
l'angle de l'incision commencée du côté opposé à celui dont on se
propose de continuer d'inciser la cornée à un degré suffisant pour
laisser sortir facilement le cristallin. Dans l'opération que j'ai faite
avec mon instrument je n'en eus besoin de ce moyen, mais j'ai vu
que la difficulté que je mets en avant peut arriver elle m'est en —
effet arrivée en opérant sur la joue de cadavre, et sur ceux de mon ton
j'ai eu lieu d'éprouver aussi dans ce cas le bon effet du moyen proposé
sans que j'en eusse même d'incertitude j'en laisse au maître
le soin de décider si j'approuve ce instrument. au reste l'on
comprend d'abord que le moyen ^{ou crochet} et mon instrument page 29 & 30
ne peuvent convenir que dans la méthode de faire l'opération de
la cataracte que j'ai appelée inférieure et non dans celle que
j'ai appelée latérale.

2^e note

mon dessin était de joindre ce cayer d'observation sur l'opération de la cataracte, avec les autres que je présente. celui-ci en est réellement la suite. mais ayant voulu de laisser de la marge sur la page des deux cotés je n'ai pu les faire rapprocher ensemble. mes affaires ne m'ont pas permis de les transcrire. et quoi qu'il en soit l'écriture n'en soit pas tant nette et saine y ajoutera néanmoins qu'on saura bien comprendre ce que je veux dire. C'est ce que volontiers il faudrait appliquer à tout mon ouvrage.

3^e note

L'instrument que j'emploie propre à inciser la cornée me paraîtroit mieux s'il étoit un peu plus à grain d'avoine et une idée ou un sixième de ligne plus long de la lame. la tige pourroit aussi avoir plus d'avantage si elle étoit un peu plus courbe. c'est ainsi qu'est celui dont je me suis servi que j'aime. faute du même ouvrage je n'ai pu la faire inciser parfaitement. par nos couteliers. on observera aussi que l'instrument a besoin d'être pressé sur tout la pointe.



22

[illegible][illegible]